


4 dec

33

Dr. Parhon



34

Doala lui Dardow



afara de exoftalmie de noi oblici & alte
semne oculare. Astfel ochi sunt larg deschisi
etc. date sau de unel în alt sferic ca pari
albul ochilor de vede deasupra & de deasupra
pupilei. Ochi sunt stralucitori. Poziția or un
or o expresiune de mânie. Convergența & defect
une or se văd mișcări involuntare & laterale
ale globilor oculari. Dăruiri albe sau sau sau
obscure & adeseori deosebite a pleoapelor
Adese or este balneant în viziunea pleoapelor

Suprafața nu are mișcări globulare oculare.
Pleoapa superioară e adese or hemeripată și în
genul pleoapelor sunt mai pigmentate de cât de
obișnui. Uși natale

Frământarea a acestor bulșoni e trăsurătoare
tare. Adese or o perapen near brui în tact
de cât mi vede.

Printre tuberculile psihice ce observăm la aceste bulșoni
sunt altele ca și în activitate psihică e exasperată
bulșoni mare mult și repede. De mișcări multe
și de comenzi repede. Atenția e foarte mobilă
și destăpă foarte vor dar de venturi în are
are dif. acuitate. Bulșoni sau bulșonilor de
plang adese or de o stăbire a memoriei. Zăgăz
sunt foarte emoțivi adese or neliniștite, anxioși
trec dar de la veselie la tristete, Une or puțin
temeri neurotice, fobii, obsesi. Mai rar tubercul
psihice foarte pronunțate, în zăgăz de țepul melancolie
sau de al mănăie în ultimul caz caracterizate
prin veselie neurotice, fugă de ideii, agitație
indiferențe etc. Se poate să așume. Deven
o conștiență mentală, cu halucinații, delirante
în vederea amb. etc.

Pe partea sistemului muscular se poate observa o slăbire însemnată a forțelor și merge uneori mâini și picioare cu o reducere de volum și musculatură micșorată și țesut și uneori se ajung la o adevărată paralizie a membrului inferior.

Printre fenomenele cutanate citez și primul rând că pielea e caldă și umedă grație efuziunii circulatiei cutanate și transpirației abundente, dar în unele cazuri se observă prurit și erupții de natură de mâncărime cu sau fără erupții de crustă, de asemenea s-au observat în colorația pielii care are tendința a fi mai închisă. În fine peete de supraalimentație alternând cu atele decolorate viteligo.

Parul capului cade aproape tot de-a-una apoi determinând în unele cazuri pierderi complete pe regiuni mai mult sau mai puțin întinse.

Și parul corpului cade uneori complet.

În ce privește funcțiunile tubului digestiv notăm că adeseori frământarea este exagerată și că se poate observa ^{notă} o exagerare a secrețiilor salivare, stomacale și intestinale, cu tendința la diaree, gâștă, vărsături și diaree. Dar se poate observa și o scădere a funcțiilor gastrice și a componentelor și acidul clorhidric și pepsină și au notat în unele cazuri hemoragii intestinale, și cauzează oare în raport cu lipsa de depozitare a grăsimilor, etc.

4) În ce privește aparatul respirator notăm mai întâi
ce numărul respirațiilor pe minut este, ca în general
sunt superficiale și scădate în cantitatea de
aer inspirat și fie corectă, și scăzută.

Turbulența vasculară se observă din partea aparatului
circulator. Palpitațiile adică batăi de inimă frecvente
bătăi sunt foarte frecvente și accelerația bătăilor
lor inimii e regulă. În loc de 70-80 pulsuri pe minut
întalnim de cel mai multe ori 120 sau chiar și
mai mult.

Arterele pedecapă adeseori se cont propriu, în
numărul prin transmiterea impulsurilor cordului
dându-se o vedere bună la arterele cordului
(la pit)

Cind bătăile propriu-zise în inimă mai întâi
se hipertrofiază prin hipertrofia musculaturii ventriculei
stângi, mai târziu se dilată și slăbește
apare astmă și fenomene de insuficiență
cardiacă.

Tensiunea sângelui e de cel mai multe ori
elevată și în special se observă o descriere
maximă de cit în starea normală unei tensiuni
maxime și ca urmare. Se înalță de
asemeni tendința la hemoragii nasale, uterine
intestinale, cutanate etc.

Tendința la răsucire e foarte frecventă în cazul
buclei de cap neocupat.

Se observă în zona zonei pe care o lașă o ușoară
scleroză a pielii în pronunțată și durabilă.

Reflexul oculocardiac adică scăderea
membrului pedatilor în urma compresiunii plebei
dându-se o scădere a pulsului sau inversat adică
o creștere a pulsului și fie urmate de o creștere

Coagulabilitatea sangelui e mai scada.
 Se pot observa varietati in plus sau in minus a la
 calcium. Din singe id poteste sa se pot gaseasca in
 unele cazuri. Se pot intalni fermenti pentru alba
 minele si ordine in singe (reactia lui Hbshalden
 pozitiv) / Semel acestor baluani administrati ovarial
 alti le maste rezistenta la intepierata cu acul si
 bla' adunandu-se ca maduva osoasa e activa si ca
 splina e viala or, mai cu seama in femele acute
 marta de volum. Tab aparatul limfatic e exi-
 tat si hipertrofia musculului se observa in majoritatea
 cazurilor.

Statul ca sinta se coregea cu exortita si ca
 se observa adeseori a decalcificarea osoasa si poate
 ajunge pana la ramolita ^{osteoporoză} ~~osteoporoză~~. Fenomenul
 e in raport cu o pierdere exagerata de calciu si
 fosfor prin urina si materi fecale.

Calitatea glandei cu secretie interna sunt interese
 in baluani. Grosim e adeseori mai si
 puter activa. Tab asa pancreasul, ovarul, testiculul
 si legatura cu scaderii functiuni pancreasului
 trebuie sa punem tendinta la crestere a functiunilor
 din singe. In legatura cu scaderii functiuni
 trebuie sa punem scaderii sau restabilirea functiunilor
 la femeie si multile dimensiuni a la glande
 mammae. Aceasta este din cauza adeseori la boala
 si boala din cauza pregata zenua de slabire
 sexuala in raport cu insuficienta testiculara.
 Glandele suprarenale sunt in exces de adeseori
 lina substanta pentru care organismul astu
 buluani e in plus, sensibilizat.

lento sau din cauza anemiei.

7

Boala aceasta care a putut fi observată și la animale (câine, cal, boi, vâc) se poate complica cu alte boale a de glandelor cu secreție internă. Astfel găsim asociate cu diabetul, cu acromegalia, tetania, boala lui Addison, cu feocromocitomul.

O putem vedea asociată cu epilepsia, miastenia cu paralizii oculare, cu coreea, isteria, cu tabagismul, cu miopatia primitivă, cu reumatismul. Unele asociații interne au fost mult de vreme de restabilite și bolnavului.

Studiu anatomopatologic al organelor în această boală are unele modificări în structura și sistemul nervos iar cele mai însemnate alterații se întâlnesc în glanda tiroidă care e mărită de volum și bogată în lizate, recedente și cu semne de funcționare scăzută așa cum se vede bine când examinăm glanda microscopic.

Din punctul de vedere al cauzelor boalei venim din de la început cu e de 50% în frecvență la femeile și cât la bărbați (50%) și că în unele cazuri este genetică. Unele boale infectioase mai cu seamă gripa, reumatismul articular acut, neori mai rar tuberculoză și sifilisul facând de altmădă un aport în etiologie dar mai cu seamă pe un timp de zile puține.

De obicei se găsește o boală acută infectivă, ereditară, traumatică, hematologică, tratamentul cu iod mercuric poate determina transformarea boalei care era într-o de insuficiență funcțională într-un organ supraactiv, atunci apare un adenom și din de tip basodivian. Se spune că fusă și basodivian.

Boala se observă mai ales la femeile adulte din de poate observa uneori și la bărbați din de copii de ambele sexe. De obicei boala e adeseori, mai gravă de cât la femeile iar copii o suferă în general mai bine ca adulții. Copii alții de acută boală care mai repede de cât e normal.

Un număr de cazuri multe ori de copii juniori, inteligente, și foarte sensibil impresional.

9. Orala lui Bredon poate fi datorita unei reactii
suprafunctionale a glandei tiroide in tumor cancer-
toase ale acestui organ. Ea poate fi secundara
unei insuficiente ovariene si a putut fi de una
multa ori observata in unele cazuri ovariene.

Pe un anumit punct vedem trei cazuri de acro-
scl. Tutu orare si glanda tiroida este relativ
analogata. Cind primale functioneaza in exact
tipul functioneaza putin si invers.

De obicei in unele cazuri acest sindrom pare
datorat unei exco functionale primare al hipofisii
si in mod secundar al glandei tiroide. Hipofisii
de obicei si substanta a exita functioneaza
tiroidiana.

10/10/20
Cea este mecanismul de producere al aceste boale.
Unii autori sîd s. atag. cî punctul de plecare
e localizat în anumite centri. nervi. Fără a
excluce complet acest mod de a concepe lucrurile
pentru unele cazuri. cel puțin de poate afirma că
valul esențial îl joacă exorul de funcționare al
glandei tiroide.

În adevăr aceasta boală se poate opune aproape
frecvent în punctul același a reglării din adenohi-
pofiză în raport cu aceste glande.

În unele cazuri se manifestă și în prezența în sânge
de substanțe de schimb și cunoscut în prezența. În boala
la sindromul hormonal se pot vedea și stări.
mai multe, e posibil la cîldura, transpirații multe
combustibile apar uneori sunt exoplate, are tendința
la diaree, ochi sunt larg desch. și de roșie, sunt
sensibili, au în unghi sunt vii etc.

De manifestări tiroideane în unele cazuri cum e
mai spus, botant în, mi sunt hădite, țesut
mai sanguin e ^{și în sânge} ~~la~~ bolnavi sunt sensibili la
frig, în timpuri de cal, pielea e uscată, au în
diferite organe sunt scapate, ochi sunt aproape
niches și la fundul în orole, au sunt astifate, omnia
leuți, vîltați în activitate, apetit etc.

În plus cile mai multe din simptomele boalei.
la sindrom se pot produce în un mod exprimentat
tel tratat animal sau pe om și se poate
cu dintr-o specie în care de glanda tiroide.

11/ Umele semine a la boala lui Diodor pot sa
a recunoaste un mecanism mai complex.

Fenomenele s-ar putea sa fie specializate pentru a necesita
pe langa expresul de functie tradiționala și pe
în jurul a unei alte substanțe anormale sau
ni expres cum e adesea în unele exemple.
asa putem intelege de ce aceste semne lipsesc

12/ m. unele copii.

Boala netratata are de cele mai multe
ori o tendinta la cronizare. Dar altii
au un proces acut sau chiar supraincalt
cum in 12% din copii se termina in
moartea.

Unii facie astazi tratamentul acestor
boale e mai bine cunoscut.

13/ Tamentul boalei lui Diodor poate fi
privit din punctul de vedere igienic,
dieta, climatoterapie, medicamente,
fizioterapie și chirurgie.
In ce priveste primul se va face acest
bunor rapoartă și pot să citim
complet.

Repozitul în pat prelungit este
de o prima și importantă medica-

Climatoterapia trebuie antea de examenul unedre
 in tratamentul bolii lui Posedru. Acest bolnav are
 suferinta caldura. Pentru deca de petraci vase
 la un climat răcoros și aerul de munte ca acela
 care la pruzle al mare bue. Din contra marea
 e de cele mai multe ori datorata pentru ei.
 Totuși cel mai puțineste printe balnearele di orael
 de provincia, am observat cel mai mare unu
 la care venite din orael Constanta

5. Miele medicamente cum oint chinina,
 arsenical pot da rezultate foarte satisfăcătoare.

De asemenea iodul în doze mici și adap-
 tate de la caz la caz. Doze mari
 sau chiar și huc la unii purtatori
 de guse mai veche pot determina
 uneori o stare de supraactivitate
 tirodiană.

16/ ✓ Ori cum ar fi tratamentul i aded trebuie uncat
ca multe prudentes, ~~si ingrat cu dgo uic.~~
Unii autor au afirmat ca tratamentul ~~adad~~
nu poate fi intrebuintat de cit ca ameliorant
si preparativ pentru operatie. Realitatea sta ca
in unele cazuri si impuneam in repausul,
regimul alimentar sau alte tratamente
dadul sub forma de di' adetrogine si special
postu adu' vndecarea completa sau chiar
determina, dacu tratamentul se auto ma' pua
multe vreme si ineficientu a glande' tiroide.
Gusa si fenomenele aceluor sunt ale unu
regimului de tratament.
Totu' pentru a nu exapra volumul
gusei e necesar in anumite cazuri unde ma'
lea' de volum a glande' e intinutata sa dau
iadul cu multe prudentes caei tratamentul
iadat core face ca rezultarea tirodiana sa
nu ma' fie dnu' uata si exa' in dnce postu
pui acumularea acestor desaturu si glande'
si, si aceasta glanda' sa gusa si
ma' mult.

Intr-o jurvota exoftalmia ceaterile recente
faente in China le dable a oratet valarea
t apentca a 10 himbine. Dar e necesa ca
acest mediu cament sa fie aplicat de timpuriu.
Daca e administrat prin tozina efectele sale sunt
minime sau nule. Or: cum ar fi pot afirma
ca ubriunitat la timp mediantul se buant
de o ef. ca utate reale.

1. Represe de supradanlepti de la am marile oras
de 5 a 30 cos plaud tirida pot fi de cremen; utilizata
in tratamentul acelor boli.

Femeile cu boala de bresdru pot beneficia
mult de unele preparate de over cum e la special
leparama.

Si unele extracte de suprenerals, Finer, etc.
nu pot fi ubriunitate cu fals.

Cu o slabire e foarte mare injectiunile de
asubstantia pot fi de defectele din ale mar dale for
form.

2) In ce priveste tratamentul fiziografic bazele lui
sau mai bine zise propriu-zis pot fi de o reala
utilitate. Vor exista la tot egal, pe cele calde.

Galvanizarea a putut fi utila si unele cazuri.
In ce priveste tratamentul radioterapic el da
adeseori rezultate bune. E' necesara
de oge unii dispozitive.

Ogile mici pot exagera activitatea glandei. In
ogile mici pot exagera fenomenul bunei
determinand intarirea si circulatia a produselor
rezultate din dezvoltarea glandei.

In plus radioterapia poate determina o aductie
a glandei tiroide de la uterului vecine care
face ca operatia sa se execute in conditii
putin favorabile daca ea ar deveni necesara.

De curand s'a propus radioterapia hipofiz.
In acest tratament pare a fi de folos atunci
cand sunt motive serioase pentru a se da
admita ca bazele lui D'Archi e scandinav
unui caz de metastaze a hipofizei care au
fost rezista in altele o substanta a
fidel dezvoltarea si activitatea glandei
tiroide

20/4

In fine cind e nevoie sa le saam repede, ope
exemplu in cazurile bolnavilor ce nu se pot
putea luxul reparului si intempru actiunilor
profesionale tratamentul chirurgical poate da
rezultate din cele mai bune.

Privedu tubus recurs la un chirurg foarte
abil si foarte experimentat, operatiunile se
troua nefind din cele mai lipsite de
inconveniente.

Amise

Radio România